



Regiões de adaptação

RS 1 e 2, SC 1 e 2, PR 1, 2 e 3 e SP 2.

ORS 1405

Características agronômicas

Ciclo	TARDIO*
Estatura de Planta	MÉDIA (88cm)
Comportamento ao acamamento	MR/R
Comportamento a debulha	MR
Crestamento	MR

* Dias da Emergência ao Espigamento: 86 dias; Dias da Emergência a Maturação: 135 dias

Qualidade Industrial

Classificação	Trigo Pão
Força de Glúten (W médio) <small>Dados de 6 anos e 28 localidades</small>	304
Estabilidade <small>Dados de 6 anos e 28 localidades</small>	14
Dureza do Grão	DURO
Coloração do Grão	VERMELHO
Peso de mil grãos (média)	35g
Germinação na Espiga	MR/R

Reação às Doenças

Oídio	MS
Ferrugem da folha	MS/S
Manchas foliares	MR
Giberela	MR
Brusone	MS/S
Mosaico	MR
VNAC	MS
Bacteriose	MR/MS

LEGENDA: AS - Altamente Suscetível; S - Suscetível; MS - Moderadamente Suscetível
MR - Moderadamente Resistente; R - Resistente; SI - Sem Informação

Destaques

- Rendimento
- Trigo de qualidade superior a Quartzito, com ótimos resultados de panificação.
- Resistência ao acamamento
- Resistência à germinação na espiga

Sugestões de Cultivo

- Densidade de população de plantas:
Para regiões 1 e 2: 300 a 330 plantas finais/m²
Para região 3: 330 a 350 plantas finais/m²
- Tratar as sementes com inseticidas sistêmicos, visando o controle de pulgões
- Doenças alvo: Oídio e Ferrugem
- Manejo de N em pré-espigamento: boa resposta em produtividade e qualidade industrial