



**ORS  
CITRINO**

Regiões de adaptação

RS 1 e 2, SC 1 e 2, PR 1, 2 e 3, SP 2 e MG 4.

## Características agronômicas

Ciclo	PRECOCE*
Estatura de Planta	MÉDIA (88cm)
Comportamento ao acamamento	MR/R
Comportamento a debulha	MR
Crestamento	MR

\* Dias da Emergência ao Espigamento: 84 dias; Dias da Emergência a Maturação: 125 dias

## Qualidade Industrial

Classificação	Trigo Pão/Melhorador
Força de Glúten (W médio) Dados de 5 anos e 15 localidades)	377
Estabilidade Dados de 5 anos e 15 localidades)	20
Dureza do Grão	DURO
Coloração do Grão	VERMELHO
Peso de mil grãos (média)	35g
Germinação na Espiga	MR/R

## Reação às Doenças

Oídio	MR/MS
Ferrugem da folha	MS
Manchas foliares	MR/MS
Giberela	MR/MS
Brusone	MS/S
Mosaico	MR
VNAC	SI
Bacteriose	MS

LEGENDA: AS - Altamente Suscetível; S - Suscetível; MS - Moderadamente Suscetível  
MR - Moderadamente Resistente; R - Resistente; SI - Sem Informação

## Destaques

- Rendimento
- Precocidade
- Qualidade industrial (estabilidade)
- Resistência ao acamamento
- Resistência à germinação na espiga
- Elevado PH

## Sugestões de Cultivo

- Densidade de população de plantas:  
Para regiões 1 e 2: 300 a 330 plantas finais/m<sup>2</sup>  
Para regiões 3 e 4: 330 a 350 plantas finais/m<sup>2</sup>
- Doença alvo: Ferrugem